

PATIËNT

Geb. dat:

Start kuur:

ALL >40 jaar : HOVON 100 ("schema C")

INDUCTIE II

CHEMOTHERAPIEKUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST

(Veranderingen op groene lijst noteren (deze lijst na opname in status bewaren))

Dat.	Dagen	Tijden	Omschrijving	Hoeveel mg	Hoeveel mg/m ²	Pomp stand	Paraaf
	Dag 1 t/m 21	09.00 15.00 21.00	PREDNISON <i>Totaal 40 mg/m²/d</i>mg mgmg	40 mg/m ² p.o. in 3 giften		
	Dag 1	10.00- 10.15	ONCOVIN (Vincristine) <i>Totaal 1,5 mg/m²</i> In 50 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 15 minmg	1,5 mg/m ² i.v., max. 2 mg		
		10.30- 11.00	DOXORUBICINE (Adriamycine) In 50 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 30 min.mg	40 mg/m ² i.v.		
	Dag 8	10.00- 10.15	ONCOVINmg	1,5 mg/m ² i.v. max. 2 mg		
		10.30- 11.00	DOXORUBICINEmg	40 mg/m ² i.v.		
	Dag 15	10.00- 10.15	ONCOVINmg	1,5 mg/m ² i.v., max. 2 mg		
		10.30- 11.00	DOXORUBICINEmg	40 mg/m ² i.v.		
			MTX (Methotrexate)* + Prednisolonmg mg	15 mg i.t. 25 mg i.t.	n.v.t. n.v.t.	

Naam + paraaf arts

Dat.	Paraaf Arts	Paraaf Vpk.	
			Hydratie: 1 - 2 ltr gluc/zout met per liter:ml KCl (20 ml)mg Lasix (5-10 mg)
			Ondansetron (Zofran): voorafgaand aan Doxorubicine 1 x 8 mg i.v. Daarna 2 x 8 mg p.o. t/m Dag 5.
			SDD: volgens schema
			Penicilline 4 x 1 milj IE/i.v. van Dag 2 tot eind mucositis
			Primolut N. 2 x 5 mg p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)

AANDACHTSPUNTEN:

- **Start inductie II Dag 22 na start Consolidatie bij Arm A of dag 29 bij Arm B:**
 - ANC > $1.0 \times 10^9/l$ en trombocyten > $100 \times 10^9/l$;
 - Patiënt in CR is;
 - Normale lever- en nierfuncties heeft;
 - WHO- preformance 0-2 is;
 - Patiënt goede, cardiale, pulmonale, neurologische en metabole functies heeft;
 - Er geen oncontroleerbare infecties zijn.

- Vochtbalans en gewicht

- Letten op voldoende proteïne intake tijdens prednison.
- Letten op neuropathie, dan vincristine dosis reduceren.

- Prednison kan meestal gewoon gestopt worden, behalve als het langer dan 6 weken gebruikt is; dan met 10 mg/dd verminderen

- Bloedsuikercontroles ivm prednisolon

- Centraal Veneuze Catheter – verzorgen volgens protocol

- **Denk aan bijhouden mucositiscore.**

- **Consolidatiekuur II (schema D) start minimaal 22 dagen na start Inductie II:**
 - ANC > $1.0 \times 10^9/l$ en trombocyten > $100 \times 10^9/l$;
 - Patiënt in CR is;
 - Normale lever- en nierfuncties heeft;
 - WHO- preformance 0-2 is;
 - Patiënt goede, cardiale, pulmonale, neurologische en metabole functies heeft;
 - Er geen oncontroleerbare infecties zijn.

- Beschermende maatregelen bij excreta, van mondlap en handschoenen kunnen 6 dagen na de laatste gift worden opgeheven datum:.....