

H O V O N 102 – ARM B
AML <65 jr.
CHEMOTHERAPIESCHEMA EERSTE KUUR

Met Clofarabine

CHEMOTHERAPIEKUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST

Veranderingen noteren op groene lijst (deze lijst na opname in status bewaren)

Dat.	Dagen	Tijden	Omschrijving	Hoeveel mg	Hoeveel mg/m ²	Pomp stand	Paraaf
	Dag 1	09.00 -10-00	CLOFARABINE Totaal 10 mg/m ² i.v. In 100 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 60 minmg	10 mg/m ² /i.v.		
		10.30- 13.30	IDARUBICINE Totaal 1 x 12 mg/ m ² / dd In 500 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 3 uurmg	12 mg/m ² / i.v.		
		14.00- 08.00	ARA-C (Cytarabine) Totaal 1 x 200 mg/m ² dd In 1000 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 18 uur (dag 1 t/m 3)mg	200 mg/m ² /i.v.		
	Dag 2	09.00 -10.00	CLOFARABINEmg	10 mg/m ² /i.v.		
		10.30- 13.30	IDARUBICINEmg	12 mg/m ² /i.v.		
		14.00- 08.00	ARA-Cmg	200 mg/m ² /i.v.		
	Dag 3	09.00 -10-00	CLOFARABINEmg	10 mg/m ² /i.v.		
		10.30- 13.30	IDARUBICINEmg	12 mg/ m ² /i.v.		
		14.00- 08.00	ARA-Cmg	200 mg/m ² /i.v.		
	Dag 4	09.00 -10.00	CLOFARABINEmg	10 mg/m ² /i.v.		
		10.00–10.00	ARA-C Totaal 1 x 200 mg/m ² dd In 1000 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 24 uur (dag 4 t/m 7)mg	200 mg/m ² /i.v.		
	Dag 5	09.00 -10.00	CLOFARABINEmg	10 mg/m ² /i.v.		
		10.00–10.00	ARA-Cmg	200 mg/m ² /i.v.		
	Dag 6	10.00-10.00	ARA-Cmg	200 mg/m ² /i.v.		
	Dag 7	10.00- 10.00	ARA-Cmg	200 mg/m ² /i.v.		

Datum	Paraaf Arts	Paraaf Vpk.	
			Hydratie is niet standaard geïndiceerd alleen bij: Hyperuricaemie, hoge tumorload (splenomegalie, Leuko > 30x10 ⁶ /l):ltr Gluc/Zout met per liter:ml NaBicarbonaat 8,4% (60 ml)ml KCl (20 ml)mg Lasix (5-10 mg)
			Zofran 2 x dd 8 mg/p.o. of i.v. van dag 1 t/m 7
			6 x dd Hypromellose 0,3% oogdruppels. Dag 1 t/m regeneratie
			Allopurinol 1 x dd 300 mg/p.o.
			SDD: Volgens schema
			Penicilline 4 x 1 milj. IE/i.v.: start dag + 8 tot dag 22 (14 dagen)
			Primolut N. 2 x 5 mg/p.o. bij vrouwen voor menopauze
			Bloedproducten bestralen

Naam arts + paraaf:

AANDACHTSPUNTEN:

- Bij blijvende misselijkheid zonodig Primperan 3 tot 4 x dd. 10 mg/p.o
- Dagelijks wegen (wanneer dit niet mogelijk is vochtbalans bijhouden)
- Mondverzorging volgens protocol
- Centraal Veneuze Catheter – Verzorgen volgens protocol
- **NB! Clofarabine over een 0,2 μ filter geven!**
- **Denk aan bijhouden mucositiscore**
- Beschermende maatregelen van mondlap en handschoenen kunnen 6 dagen na de laatste gift worden opgeheven datum:.....