

**H O V O N 102 Arm B**  
**AML < 65 jr**  
**CHEMOTHERAPIESHEMA TWEDE KUUR**

*Met Clofarabine*

**CHEMOTHERAPIEKUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST**

Veranderingen noteren op groenelijst (deze lijst na opname in status bewaren)

Dat.	Dagen	Tijden	Omschrijving	Hoeveel mg	Hoeveel mg/m <sup>2</sup>	Pomp stand	Paraaf
	<b>Dag 1</b>	09.00–12.00	<b>ARA-C (Cytarabine)</b> Totaal 2 x 1000 mg/m <sup>2</sup> /dd In 500 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 3 uur	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		17.00-18.00	<b>CLOFARABINE</b> Totaal 10 mg/m <sup>2</sup> i.v In 100 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 60 min	.....mg	10 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		21.00–24.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 2</b>	09.00–12.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		17.00-18.00	<b>CLOFARABINE</b>	.....mg	10 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		21.00–24.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 3</b>	09.00–12.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		17.00-18.00	<b>CLOFARABINE</b>	.....mg	10 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		21.00–24.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 4</b>	09.00–12.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		13.00- 14.00	<b>AMSA (Amsacrine)</b> Totaal 1 x 120 mg/m <sup>2</sup> /dd In 500 ml Gluc 5% Inlooptijd 1 uur	.....mg	120 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		17.00-18.00	<b>CLOFARABINE</b>	.....mg	10 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		21.00–24.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 5</b>	09.00–12.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		13.00- 14.00	<b>AMSA</b>	..... mg	120 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		17.00-18.00	<b>CLOFARABINE</b>	.....mg	10 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		21.00–24.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 6</b>	09.00–12.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		13.00- 14.00	<b>AMSA</b>	..... mg	120 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		21.00–24.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		

Dat.	Paraaf Arts	Paraaf Vpk.	
			Hydratie in niet standaard geïndiceerd .....ltr Gluc/Zout met per liter .....ml NaBicarbonaat 8,4% (60 ml) .....ml KCl (20 ml) .....mg Lasix (5-10 mg)
			Zofran: 2 x 8 mg p.o. of i.v. dag 1 t/m dag 7
			<b>Indien nog hoge tumorload Allopurinol 1 x 300 mg/dd/p.o (CAVE-ALLERGIE )</b>
			SDD: Volgens schema
			Penicilline 4 x 1 milj.IE/i.v. start dag +8 tot dag 22 (14 dg).
			Pyridoxine 1 x 250 mg/dd/p.o. t/m dag 8
			Primolut N. 2 x 5 mg/dd/p.o. bij vrouwen voor de menopauze
			Hypromellose 0,3% oogdruppels 6 x dd. Start Dag 1 t/m regeneratie
			<b>Bloedproducten: bestralen</b>

Naam arts + paraaf:

## AANDACHTSPUNTEN:

- Eventueel bij blijvende misselijkheid: zonodig primperan 3 tot 4 x dd. 10 mg. p.o.
- Dagelijks wegen, vochtbalans
- Centraal Veneuze Catheter verzorgen volgens protocol
- **NB! Clofarabine over een 0,2 $\mu$  filter geven!**
- **Denk aan bijhouden mucositiscore**
- Mondverzorging volgens protocol.
  
- Indien remissie en geen allogene stamcel donor dan stamcelaferese bij regeneratie 2 e kuur ( $0,5 \times 10^9/L$  granulocyten) start **filgrastim (G-CSF) 5  $\mu g/kg/dd$  s.c.** Doorgaan tot na de aferese.
  
- NB als de patiënt in aanmerking komt allogene vooraf de comorbidity index invullen!
  
- Beschermende maatregelen bij excreta, van mondlap en handschoenen kunnen 6 dagen na de laatste gift worden opgeheven datum:.....