

HOVON 79/ PETHEMA SCHEMA / LPA 2005  
AML M3, t(15;17) <75 jr.

CONSOLIDATIEKUUR 1 – INTERMEDIATE-RISK

CHEMOTHERAPIESHEMA

CHEMOTHERAPIEKUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST

Veranderingen op groene lijst noteren (deze lijst na opname in status bewaren)

Dat.	Dgn.	Tijden	Omschrijving	Hoeveel mg	Hoeveel mg/m <sup>2</sup>	Pomp stand	Paraaf
	<b>Dag 1</b>	09.00–09.15	<b>IDARUBICINE</b> Totaal 1 x 7 mg/ m <sup>2</sup> /dd In 100 ml NaCl 0,9% Inlooptijd:15 min	.....mg	7 mg/m <sup>2</sup> /i.v		
	<b>Dag 2</b>	09.00–09.15	<b>IDARUBICINE</b>	.....mg	7 mg/m <sup>2</sup> /i.v		
	<b>Dag 3</b>	09.00–09.15	<b>IDARUBICINE</b>	.....mg	7 mg/m <sup>2</sup> /i.v		
	<b>Dag 4</b>	09.00–09.15	<b>IDARUBICINE</b>	.....mg	7 mg/m <sup>2</sup> /i.v		

Datum	Paraaf Arts	Paraaf Vpk.	
			<b>ATRA 45 mg/m<sup>2</sup>/dd DAG 1 t/m DAG 14</b>
			Tijdens Idarubicine Zofran 2 x 8 mg/dd/i.v, in plaats van oraal
			ATRA 45 mg/m <sup>2</sup> /dd p.o Dag 1 tot dag 15. Pat. < 20 jr: 25 mg/m <sup>2</sup> . <b>(afroeden in veelvoud van 10) Verdeeld over 2 giften</b>
			S.D.D Ciproxin 2 x 250 mg/dd/p.o (CAVE-ALLERGIE) Diflucan 150 mg/dd/p.o
			Primolut N. 2 x 5 mg/dd/p.o bij vrouwen voor de menopauze.

**AANDACHTSPUNTEN:**

- Bij blijvende misselijkheid zonodig Primperan 3 tot 4 x 10 mg/p.o
- Ciproxin – indien oraal onmogelijk dan 2 x 200 mg/i.v
- Dagelijks wegen, vochtbalans.
- Mondverzorging volgens protocol
- Centraal Veneuze Catheter – Verzorgen volgens protocol
- **Denk aan bijhouden mucositiscore**