

HOVON 79 PETHEMA / LPA 2005
AML M3, t(15;17) <75 jr.

CONSOLIDATIEKUUR 1 – LOW RISK

CHEMOTHERAPIESHEMA

CHEMOTHERAPIEKUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST

Veranderingen op groene lijst noteren (deze lijst na opname in status bewaren)

Dat.	Dgn.	Tijden	Omschrijving	Hoeveel mg	Hoeveel mg/m ²	Pomp stand	Paraaf
	Dag 1	09.00–09.15	IDARUBICINE <i>Totaal 1 x 5 mg/ m²/dd</i> In 100 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 15 min.mg	5 mg/m ² /i.v		
	Dag 2	09.00–09.15	IDARUBICINEmg	5 mg/m ² /i.v		
	Dag 3	09.00–09.15	IDARUBICINEmg	5 mg/m ² /i.v		
	Dag 4	09.00–09.15	IDARUBICINEmg	5 mg/m ² /i.v		

Datum	Paraaf Arts	Paraaf Vpk.	
			Tijdens Idarubicine Zofran 2 tot 3 x 8 mg/dd/i.v, in plaats van oraal.
			ATRA 45 mg/m ² /dd p.o Dag 1 tot dag 15. Pat. < 20 jr: 25 mg/m ² . (afroonden in veelvoud van 10) Verdeeld over 2 giften
			S.D.D: Ciproxin 2 x 250 mg/dd/p.o (CAVE-ALLERGIE) Diflucan 150 mg/dd/p.o
			Primolut N. 2 x 5 mg/dd/p.o bij vrouwen voor de menopauze.

AANDACHTSPUNTEN:

- Bij blijvende misselijkheid zonodig Primperan 3 tot 4 x 10 mg/p.o
- Bij patiënten < 20 jaar de ATRA reduceren naar 25 mg/m²/p.o verdeeld over 2 porties.
- Ciproxin – indien oraal onmogelijk dan 2 x 200 mg/i.v
- Dagelijks wegen, vochtbalans.
- Mondverzorging volgens protocol
- Centraal Veneuze Catheter – Verzorgen volgens protocol
- **Denk aan bijhouden mucositiscore**