

HOVON 79 / PETHEMA / LPA 2005
AML M3, t(15;17) <75 jr.

CONSOLIDATIEKUUR 3 – LOW RISK

CHEMOTHERAPIESHEMA

CHEMOTHERAPIEKUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST

Veranderingen op groene lijst noteren(deze lijst na opname in status bewaren)

Dat.	Dgn.	Tijden	Omschrijving	Hoeveel mg	Hoeveel mg/m ²	Pomp stand	Paraaf
	Dag 1	09.00–09.15	IDARUBICINE Totaal 1 x 12 mg/m ² /dd In 100 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 15 minmg	12 mg/m ² /dd		

Datum	Paraaf Arts	Paraaf Vpk.	
			Tijdens Idarubicine Zofran 2 tot 3 x 8 mg/dd/i.v Zonodig op dag 2 nog 2 tot 3 x 8 mg/p.o
			ATRA 45 mg/m ² /dd p.o Dag 1 tot dag 15. Pat. < 20 jr: 25 mg/m ² . (afroeden in veelvoud van 10) Verdeeld over 2 giften
			S.D.D op indicatie

Naam + paraaf arts:

AANDACHTSPUNTEN:

- Drie weken na chemotherapie beenmerg evaluatie met PCR. Indien PCR t(15,17) negatief is, start onderhoudsbehandeling.
- **Denk aan bijhouden mucositiscore**