

HOVON 79/ PETHEMA / LPA 2005
AML M3, t(15;17) <75 jr.
INDUCTIEKUUR (Low-risk, Intermediate-risk en High-risk)
CHEMOTHERAPIESHEMA

CHEMOTHERAPIEKUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST

Veranderingen op groene lijst noteren (deze lijst na opname in status bewaren)

Dat.	Dgn.	Tijden	Omschrijving	Hoeveel mg	Hoeveel mg/m ²	Pomp stand	Paraaf
	Dag 2	09.30–09.45	IDARUBICINE Totaal 1 x 12 mg/m ² /dd In 100 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 15 min.mg	12 mg/m ² /dd		
	Dag 4	09.30–09.45	IDARUBICINEmg	12 mg/m ² /dd		
	Dag 6	09.30–09.45	IDARUBICINEmg	12 mg/m ² /dd		
	Dag 8	09.30–09.45	IDARUBICINE* alleen indien patient < 70 jrmg	12 mg/m ² /dd		

Datum	Paraaf Arts	Paraaf Vpk.	
			ATRA 45 mg/m ² /dd p.o vanaf dag 1 tot CR, max. 90 dagen. Pat. < 20 jr: 25 mg/m ² . (afroeden in veelvoud van 10) Verdeeld over 2 giften.
			Dexamethason 2,5 mg/m²/dd p.o dag 1 t/m dag 15 bij leuco's >5x10⁹/l
			Hydratie is niet standaard geïndiceerd, alleen bij: Hyperuricaemie, hoge tumorload (splenomegalie, leuco's > 30 x 10 ⁶ /l):ltr Gluc/Zout met per liter:ml NaBicarbonaat 8,4 % (60 ml)ml KCL (20 ml)mg Lasix (5-10 mg)
			Zofran van dag 1 t/m dag 8 – 2 x 8 mg/dd/p.o Tijdens Idarubicine Zofran 2 x 8 mg/dd/i.v, in plaats van per os.
			Allopurinol 1 x dd 300 mg/dd/p.o (CAVE ALLERGIE)
			S.D.D Ciproxin 2 x 250 mg/dd/p.o (CAVE ALLERGIE) Fungizone susp. 4 x 5 ml/dd/p.o
			Penicilline 4 x 1 milj.IE/dd/i.v Start dag + 9 tot dag 23 (14 dg.)
			Primolut N. 2 x 5 mg/dd/p.o bij vrouwen voor de menopauze.

Naam + paraaf arts:

AANDACHTSPUNTEN:

- **Risico van "ATRA-syndroom" i.e pulmonale problemen: onderbreek ATRA en geef dexamethason (2 x 10 mg dd i.v.)**
- **Bij fibrinolyse overweeg cyclokapron 3-4 x 1000 mg dd p.o.**
- Patiënten > 70 jr met een AML M3 krijgen alleen op dag 2, 4 en 6 Idarubicine.
- Patiënten <20 jaar krijgen ATRA 25 mg/m² in 2 doses
- Bij blijvende misselijkheid zonodig Primperan 3 tot 4 x 10 mg/dd/p.o.
- Bij allergie op Penicilline, Bactrimel 3 x 960 mg/dd/p.o.
- Ciproxin – indien oraal onmogelijk dan 2 x 200 mg/dd/i.v.
- Indien geen inname van Fungizone p.o of Diflucan p.o. eventueel Diflucan 100 mg/dd/i.v.
- Dagelijks wegen, vochtbalans
- Mondverzorging volgens protocol
- **Denk aan bijhouden mucositiscore**
- Centraal Veneuze Catheter – Verzorgen volgens protocol
- Voor start chemotherapie AML cellen uit beenmerg en/of perifere bloed laten invriezen (1 stolbuis serumarchief hematologie)
- Beenmergevaluatie bij regeneratie
- Beschermende maatregelen van mondlap en handschoenen kunnen 6 dagen na de laatste gift worden opgeheven datum:.....