

**FLUDARABINE/CYCLOFOSFAMIDE / ALEMTUZUMAB  
HOVON 68 (CLL)  
ARM B**

**CHEMOTHERAPIEKUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST**

Veranderingen op groene lijst noteren (deze lijst na opname in status bewaren)

**ALEMTUZUMAB WORDT ALLEEN BIJ DE 1<sup>e</sup> KUUR, Arm B IN EEN OPLAADDOSIS VAN 3 DAGEN GEGEVEN (zie schema)**

| Dat. | Dagen Alleen 1 <sup>e</sup> kuur | Tijden | Omschrijving             | Hoeveel mg | Hoeveel mg/ m <sup>2</sup>  | Paraaf |
|------|----------------------------------|--------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------|
|      | Dag -1                           |        | ALEMTUZUMAB (MabCampath) | 30 mg/s.c. | n.v.t.                      |        |
|      | Dag 0                            |        | ALEMTUZUMAB              | 30 mg/s.c. | n.v.t.                      |        |
|      | Dag 1                            |        | ALEMTUZUMAB              | 30 mg/s.c. | n.v.t.                      |        |
|      | Dag 1 t/m Dag 3                  |        | CYCLOFOSFAMIDE **        | .....mg    | 250 mg/m <sup>2</sup> /p.o. |        |
|      | Dag 1 t/m Dag 3                  |        | FLUDARABINE *            | .....mg    | 40 mg/m <sup>2</sup> /p.o.  |        |

**FC kuur (Oraal)  
(Fludarabine/Cyclofosfamide)  
CHEMOTHERAPIESHEMA**

**IN KUUR 2-6, ALEMTUZUMAB ALLEEN OP DAG 1.**

| Dat. | Dagen           | Tijden | Omschrijving     | Hoeveel mg | Hoeveel mg/ m <sup>2</sup>  | Paraaf |
|------|-----------------|--------|------------------|------------|-----------------------------|--------|
|      | Dag 1           |        | ALEMTUZUMAB      | 30 mg/s.c. | n.v.t.                      |        |
|      | Dag 1 t/m Dag 3 |        | CYCLOFOSFAMIDE * | .....mg    | 250 mg/m <sup>2</sup> /p.o. |        |
|      | Dag 1 t/m Dag 3 |        | FLUDARABINE **   | .....mg    | 40 mg/m <sup>2</sup> /p.o.  |        |

\* Afronden tot veelvoud van 50 mg

\*\* Afronden tot veelvoud van 10 mg

| Dat. | Paraaf arts | Paraaf vpk |   |
|------|-------------|------------|---|
|      |             |            | Zofran: dag 1,2 en 3: 8 mg/p.o.<br>'s avonds nogmaals 8 mg/p.o.<br>Evt. op dag 4: 1 x dd 8 mg/p.o zolang als nodig is: max. 5 dagen |
|      |             |            | Co-trimoxazol 1 x 480 mg/dd/ p.o. minimaal tot 3 mnd. na laatste kuur   |
|      |             |            | Valaciclovir 2 x 500 mg/dd/p.o.   |

**Dosis aanpassingen FC kuren**

- indien graad = 3 cytopenie, niet gerelateerd aan beenmerg infiltratie, 2 wk uitstel en daarna met 25% reductie geven, ook de verdere kuren.
- Indien na 2 wk de graad = 3 cytopenie nog steeds aanwezig, gaat patient off protocol.
- Indien de cytopenie aanblijft dan nogmaals de dosis van de fludarabine en cyclofosfamide verlagen met 50%.
- Indien er een graad = 3 neutropenie is ontstaan met infectie, kan G-CSF worden gegeven.
- Voor de alemtuzumab geldt geen reductie.

**Voorzorgen bij het geven van Alemtuzumab**

- bij verschijnselen van koorts, huiduitslag, koude rillingen of tensie daling: clemastine 2 mg/p.o. en paracetamol 500 mg/p.o. herhalen 30 minuten voor volgende injecties

**AANDACHTSPUNTEN:**

- Frequentie 1 x per 4 weken.

- **STUDIEMEDICATIE: BESTELFORMULIER FAXEN NAAR SCHERING NEDERLAND, zie site.**

- **Bij uitschrijven therapie lijst studie nummer = HOVON 68 en zo mogelijk Apotheek nr. 12NAT01084 vermelden**
- Bloedproducten BESTRALEN.
- Bij CMV reactivatie: valganciclovir 2 x 900 mg/dd/p.o tot herstel, daarna 1 x 900 mg/dd/p.o.
- Beschermende maatregelen bij excreta, van mondlap en handschoenen kunnen 3 dagen na de laatste gift worden opgeheven datum:.....

**Naam + paraaf arts:**